



Šiurkščioji kempė

Trametes hirsuta

Rangas: **species**

2

STEBĖJIMŲ

2

STEBĖTOJŲ

Balandis

PIKO MĒNUO

KARALYSTĖ

Fungi

KLASĖ

Agaricomycetes

ŠEIMA

Polyporaceae

GENTIS

Trametes

Kur ir kada stebėti?

Dažniausiai aptinkama šeškinės ozo šiaurinė dalis. Daugiausia stebėjimų užfiksuota balandį.

Apie rūšį

Šiurkščioji kempė (*Trametes hirsuta*) - priklauso kempininių (Polyporaceae) šeimos grybų genčiai.

Vaisiakūniai vienmečiai, pusiau apskritų kepurėlių pavidalo, pavienių, rečiau suaugusių po kelias, čerpiškai viena virš kitos, kraštu priaugusių prie medžio žievės, 3-10 cm skersmens, iki 1 cm storio. Paviršius apaugęs tankiais plaukeliais, rievėtas, balkšvas, gelsvas, gelsvai rusvas. Himenoforas lygus, baltas, gelsvas, pilkas, poros apskritos. Cistidžių nėra, hifų sistema trimitinė. Sporos 6-8 x 2-2,5 μm.

Auga tik ant negyvos lapuočių, labai retai spygliuočių medienos. Auga ant beržų, lazdynų, liepų, drebulių, gluosnių, slyvų, obelų, vyšnių ir kt., pasitaiko ir ant pušų, eglių išvartų, stuobrių, šakų, kelmų, sukelia baltąjį medienos puvinį. Labai dažna. Gana dažna ir soduose ant negyvų ir nudžiūvusių slyvų, rečiau obelų, kriaušių.



Skenuok ir peržiūrėk naujausią informaciją

seskinesozas.lt

Biologinės įvairovės projektas

Duomenys: iNaturalist, Wikipedia, GBIF

iNaturalist rūšies puslapis