



strazdas giesmininkas

Turdus philomelos

Apsaugos statusas: **Mažai rūpinomas (LC)**

Rangas: **species**

3

STEBĖJIMŲ

2

STEBĖTOJŲ

Balandis

PIKO MĒNUO

KARALYSTĖ

Animalia

KLASĖ

Aves

ŠEIMA

Turdidae

GENTIS

Turdus

Kur ir kada stebėti?

Dažniausiai aptinkama šeškinės ozo šiaurinė dalis. Daugiausia stebėjimų užfiksuota balandį. Geriausias stebėjimo metas — ankstyvas rytas (ypač iki 9 val.).

Apie rūšį

Strazdas giesmininkas – žvirblinių paukščių (Passeriformes) būrio, strazdinių (Turdidae) šeimos paukščių rūšis.

Taksonomija

Strazdą giesmininką pirmasis 1831 m. aprašė vokiečių ornitologas Christianas Liudvikas Brehmas (Christian Ludwig Brehm), kuris rūšiai suteikė *Turdus philomelos* pavadinimą. Genties pavadinimas *Turdus* lotyniškai reiškia strazdą, o specifinis antrasis epitetas susijęs su graikų mitologijos deive Filomela, kuriai buvo nupjautas liežuvis, ir ji pavirto gi edančiu paukščiu. Jos vardas kilęs iš senovės graikų Φίλο „filo“ - (meilužis) ir μέλος „melos“ (giesmė).

Rastos strazdų giesmininkų fosilijos datuojamos ankstyvojo pleistoceno epocha, prieš 1,5-2,5 milijonus metų.

Po atliktų molekulinį tyrimų paaiškėjo, kad artimiausi strazdams giesmininkams yra į juos morfologiškai panašūs a maliniai strazdai (*Turdus viscivorus*) ir kininiai strazdai (*Turdus mupinensis*). Šios trys rūšys yra ankstyvosios Eurazijos strazdų linijos atšakos, atsiradusios po to, kai jie iš Afrikos žemyno išplito į šiaurę. Šios trys rūšys yra mažiau artimos kitoms europinėms strazdų rūšims, pavyzdžiui, juodiesiems strazdams (*Turdus merula*), kilusiems iš protėvių, kurie iš Afrikos kolonizavo Kanarų salas, ir vėliau pasiekė Europą.

Paplitimas

Paplitęs Eurazijoje nuo Pirėnų kalnų, Britų salų ir Skandinavijos pusiasalio vakaruose iki Lenos slėnio rytuose. Arealo šiaurinė riba eina Kolos pusiasaliu, Baltąja jūra, Pečioros vidurupiu, Obės žemupiu ir Jenisėjaus vidurupiu. Pietuose siekia Bialą, Altajų, Irtyšiaus žemupį, Uralo, Volgos upių vidurupius, Užkaukazę, Mažąją Aziją, Viduržemio jūros pakrantę.

Žiemoja Pietų ir Vakarų Europoje, Šiaurės Afrikoje, Irane.

Introdukuotas Naujojoje Zelandijoje, Australijoje.

Išvaizda

Strazdas giesmininkas šiek tiek didesnis už paprastąjį varnėną. Jo kūno ilgis 20–23 cm, svoris nuo 50 iki 107 g. Sparno ilgis 10,9-12,4 cm, o atstumas tarp abiejų išskleistų sparnų galų 33-36 cm.

Viršutinė kūno dalis gelsvai rusva, kūno apačia balsva, krūtinė turi rusvą atspalvį, gausiai išmarginta rudomis dėmelėmis. Kūno šonai ir sparnų vidinė dalis geltoni. Snapas juodai rusvas, kojos rausvai pilkos arba gelsvai rusvos. Tik išsiritusių jauniklių nugara apaugusi gana ilgais gelsvai rudais pūkais.

Perėjimas

Peri lapuočių giriose ir šiluose su eglių priemaiša. Pirmenybę teikia jaunuolynams.

Lizdą krauna tik patelė, patinėlis jai nepadeda, bet netoliese gieda. Lizdas 0–12 m, bet dažniausiai 1–2 m aukštyje, daugiausia nedidelėse eglėse, kartais skirpstuose, baltalksniuose, pušyse. Jį lipdo seilėmis iš papuvusios medienos. Ki aušinius deda balandžio-gegužės ir birželio-liepos mėnesiais. Deda nuo 2 iki 7, bet dažniausiai 4-5 šviesiai melsvus su juodais taškais kiaušinius. Peri tik patelė apie 12-13 dienų. Išsiritę jaunikliai kol apsiplunksnuoja lizde išbūna 12–16 d. Palikusius lizdą jauniklius tėvai dar maitina 15-20 dienų, kol jie tampa savarankiški. Veda dvi, tris ir kartais net keturias jauniklių vadas, bet tai priklauso nuo geografinio regiono, maisto šaltinių ir klimatinė palankių sąlygų. Jauniklių priešai yra varniniai (Corvidae) paukščiai, suopiai (Buteoninae).

Mityba

Maistą paprastai renka žemės paviršiuje, šokuodamas ilgais šuoliukais. Maisto ieško tarpgirių pievose, soduose. Visalesis. Minta sliekais, minkštakūniais, grambuolių ir sprakšių lervomis, sprindžių, lapsukių, pelėdgalvių vikšrais, įvairiomis uogomis (mėlynėmis, medlievomis, serbentais, šaltekniais, šermukšniais).

Elgsena

Skraido ir gieda dieną, prieblandos metu. Gieda skardžiai, dažniausiai eglių viršūnėse.



Skenuok ir peržiūrėk
naujausią informaciją

seskinesozas.lt

Biologinės įvairovės projektas
Duomenys: iNaturalist, Wikipedia, GBIF
iNaturalist rūšies puslapis