



## Ožkabarzdis asiūklis

*Equisetum pratense*

Rangas: **species**

2

STEBĖJIMŲ

2

STEBĖTOJŲ

**Balandis**

PIKO MĖNUO

KARALYSTĖ

**Plantae**

KLASĖ

**Polypodiopsida**

ŠEIMA

**Equisetaceae**

GENTIS

*Equisetum*

### Kur ir kada stebėti?

Dažniausiai aptinkama šeškinės ozo šiaurinė dalis. Daugiausia stebėjimų užfiksuota balandį.

### Apie rūšį

Ožkabarzdis asiūklis – asiūklūnų (Equisetophyta) skyriaus augalas, priklauso sporinių induočių augalų grupei. Auga p ievose, pakelėse, apydrėgnuose miškuose.

### Morfologija

Augalas iki 30 cm aukščio. Vegetatyviniai ir sporifikuojantieji stiebai išauga tuo pačiu laiku, pavasarį. Varpa pailgai ovališka arba beveik cilindriška. Sporifikuoja balandžio–gegužės mėnesiais.

Šakos nešakotos. Vegetatyvinių stiebų jos ilgos, horizontaliai atsilošusios, o sporifikuojančių ir sporoms išbyrėjus p ažaliuojančių trumpesnės. Stiebai su 10-20 briaunelių, Tuščiaviduriai, lapų makštys 3-5 x 2-4 mm, turi 8-18 dantelių.

Pirmas šakos narelis trumpesnis už lapamakštę.

### Paplitimas

Randamas visame šiauriniame pusrutulyje, kosmopolitinė rūšis. Dažna ir Lietuvoje.

### Toksiškumas

Suvartojus pakankamą kiekį nuodingas.

== Šaltiniai ==



Skenuok ir peržiūrėk  
naujausią informaciją

**seskinesozas.lt**

Biologinės įvairovės projektas

Duomenys: iNaturalist, Wikipedia, GBIF

iNaturalist rūšies puslapis