



miltninis lendrūnas

Calamagrostis epigejos

Rangas: **species**

3

STEBĖJIMŲ

2

STEBĖTOJŲ

Liepa

PIKO MĒNUO

KARALYSTĖ

Plantae

KLASĖ

Liliopsida

ŠEIMA

Poaceae

GENTIS

Calamagrostis

Kur ir kada stebėti?

Dažniausiai aptinkama šeškinės ozo centrinė dalis. Daugiausia stebėjimų užfiksuota liepą.

Apie rūšį

Smiltyninis lendrūnas – miglinių (Poaceae) šeimos lendrūnų (*Calamagrostis*) genties augalas. Savaiame paplitęs Eurazijoje ir Afrikoje, taip pat ir Lietuvoje. Introdukuotas Šiaurės Amerikoje.

Ekologija

Auga pamiškėse, miškuose, kirtimuose, pakelėse, kopose, smėlynuose ir smėlėtose upių pakrantėse. Mėgsta nederlingus sausus dirvožemius.

Labai stelbia miško kultūras.

Biologija

Tai daugiametis, retakeris, 80-150 cm aukščio žolinis augalas, stambesnis už miškinį lendrūną (*C. arundinacea*). Turi ilgus, šliaužiančius šakniastebius. Stiebas status, tvirtas, prie šluotelės šiurkštus. Lapų viršutinė pusė šiurkšti. Lapalakščiai iki 70 cm ilgio, iki 2 cm pločio, mėlynos, pilkšvai žalios spalvos, smailiomis viršūnėmis. Liežuvėlis 4-12 mm ilgio, tvirtas.

Šluotelė stati, 15-30 cm ilgio, tanki, rudos spalvos, jos šakelės iki 10 cm ilgio. Varputės vienažiedės, 5-7 mm ilgio, susitelkusios kuokštais, dažniausiai violetinės. Kuokeliai trys. Žiedus apdulkina vėjas.

Žydi birželio-rugpjūčio mėnesiais. Vaisius – beveik ovalus, gelsvai rusvas arba gelsvai žalsvas, nelygiu paviršiumi grūdas su liekančiais žiedažvyniais. Vaisiai subręsta rugpjūčio-spalio mėnesiais. Augalas dauginasi vegetatyviškai šakniastebiais ir sėklomis.

Naudojimas

Smiltyninis lendrūnas auginamas kaip dekoratyvinis augalas darželiuose, gėlynuose. Naudingas ten, kur reikia sutvirtinti birų smėlį.



Skenuok ir peržiūrėk
naujausią informaciją

seskinesozas.lt

Biologinės įvairovės projektas

Duomenys: iNaturalist, Wikipedia, GBIF

iNaturalist rūšies puslapis