



Geltonmargė Hesperija

Carterocephalus silvicola

Rangas: **species**

1

STEBĖJIMŲ

1

STEBĖTOJŲ

Gegužė

PIKO MĒNUO

KARALYSTĖ

Animalia

KLASĖ

Insecta

ŠEIMA

Hesperiidae

GENTIS

Carterocephalus

Kur ir kada stebėti?

Daugiausia stebėjimų užfiksuota gegužę. Geriausias stebėjimo metas — vidurdienis šiltą saulėtą dieną.

Apie rūšį

Geltonmargė hesperija (*Carterocephalus silvicola*) – hesperijų (*Hesperiidae*) šeimos drugys.

Lytinis dimorfizmas ryškus. Patino sparnų viršus geltonas su juodomis dėmėmis. Patelės sparnų viršus su panašiu, bet intensyvesniu juodu raštu, primenančiu rudmargės hesperijos (*Carterocephalus palaemon*).

Sparno ilgis: 12-15 mm.

Skraido nuo gegužės vidurio iki birželio mėnesio vidurio drėgnose pievose, pamiškėse, krūmynuose, pagrioviuose.

Mitybiniai augalai: diršė (*Bromus* sp.), sorokė (*Milium* sp.), kietavarpė (*Cynosurus* sp.).

Kiaušinėlius deda po vieną ant mitybinių augalų. Žiemoja tarp susuktų mitybinių augalų lapų.

Paplitimas: Europa, Sibiras iki Ramiojo vandenyno.



Skenuok ir peržiūrėk
naujausią informaciją

seskinesozas.lt

Biologinės įvairovės projektas

Duomenys: iNaturalist, Wikipedia, GBIF

iNaturalist rūšies puslapis