



Dėmėtasis Auksavabalis

Protætia cuprea

Rangas: **species**

2

STEBĖJIMŲ

2

STEBĖTOJŲ

Gegužė

PIKO MĖNUO

KARALYSTĖ

Animalia

KLASĖ

Insecta

ŠEIMA

Scarabaeidae

GENTIS

Protætia

Kur ir kada stebėti?

Daugiausia stebėjimų užfiksuota gegužę. Geriausias stebėjimo metas — vidurdienis šiltą saulėtą dieną.

Apie rūšį

Dėmėtasis auksavabalis – auksavabalių (Cetoniidae) šeimos vabalas. Paplitęs Europoje. Dažniausia *Protætia* genties rūšis Lietuvoje.

Biologija

Vabalas dažniausiai tamsiai žalias, kiek metališkai violetinio arba rudo atspalvio. Kūno apačia žalsvai ar rausvai violetinė, apaugusi šviesiais plaukeliais. Antsparniuose akivaizdžios balsvos arba rudos netaisyklingos dėmelės, kurios p riešugarėlėje yra labai mažos arba jų nėra.

Auksavabalio lervos vystosi trūnijančioje medienoje ir skruzdėlynų, suneštų rudųjų miško skrudėlių *Formica rufa* bei *C amponotus herculeanus*, pakraščiuose. Auksavabalio patelės padeda kiaušinėlius šalia skruzdėlynų. Lervos vystosi 2 me tus. Vabalai skraido saulėtomis dienomis birželio–rugsjūčio mėn. Juos traukia žolinių, ypač skėtinių, augalų ir krūmų ži edai.



Skenuok ir peržiūrėk
naujausią informaciją

seskinesozas.lt

Biologinės įvairovės projektas
Duomenys: iNaturalist, Wikipedia, GBIF
iNaturalist rūšies puslapis