



Raukšlinis žiūrytis

Tremella mesenterica

Rangas: **species**

1

STEBĖJIMŲ

1

STEBĖTOJŲ

ausis

PIKO MĒNUO

KARALYSTĖ

Fungi

KLASĖ

Tremellomycetes

ŠEIMA

Tremellaceae

GENTIS

Tremella

Kur ir kada stebėti?

Daugiausia stebėjimų užfiksuota sausį.

Apie rūšį

Raukšlinis žiūrytis (*Tremella mesenterica*) – žiūrytinių šeimos grybų rūšis.

Vaisiakūniai nedideli, 2-5 (6) cm skersmens, apskriti, netaisyklingos formos, garbanoti giliai raukšlėti, smegenų pavidalo, gniužulai. Jauni būna oranžiškai geltoni, sendami išblunka iki sieros geltonumo, gelsvos, balsvos spalvos, drebučių konsistencijos.

Trama drebutinė, vėliau – minkšta, o sena – net ištižusi, suglebusi.

Sporos 9-12 x 8-10 μm.

Būdingi požymiai: geltoni, oranžiniai, garbanoti gniužulai, drebučių konsistencijos.

Padžiūvę, palijus arba po nedidelių šalčių (iki -10 °C) vėl atgyja, auga toliau.

Auga miškuose, parkuose ištisus metus, net žiemą, ant suverstų lapuočių medžių, ypač ant drebulės, beržo šakų, stuobrių, išvartų. Nevalgomas, labai dažnas.



Skenuok ir peržiūrėk
naujausią informaciją

seskinesozas.lt

Biologinės įvairovės projektas

Duomenys: iNaturalist, Wikipedia, GBIF

iNaturalist rūšies puslapis