



## Kolembolos

*Collembola*

Rangas: **subclass**

1

STEBĖJIMŲ

1

STEBĖTOJŲ

Gegužė

PIKO MĖNUO

KARALYSTĖ

**Animalia**

KLASĖ

**Collembola**

### Kur ir kada stebėti?

Daugiausia stebėjimų užfiksuota gegužę.

### Apie rūšį

Kolembolos (Collembola) – Entognatha klasės būrys, kuriam priklauso 1-2 mm dydžio ir pilvelio apačioje turintys šokamąjį prietaisą šešiakojai nariuotakojai. Dėl šio šokamojo prietaiso kolembolos yra nusprigiamos pirmyn. Burnos organai graužiamieji, todėl minta augalinėmis liekanomis, detritu ir kt. Kolembolų gyvenimo trukmė – 2 mėn., o žiemojančių individų – iki vienerių metų.

Gyvena samanose, žolėje, žemėje, puvėsiuose, sutrūnijusiuose kelmuose, neretai aptinkamos ant sniego (dažniausiai kovo mėn.). Kai kurios rūšys kenkia augalams šiltnamiuose, vazonuose.

Būryje yra apie 6000 rūšių. Lietuvoje – daugiau kaip 50 rūšių.

Lietuvoje aptinkamos šios šeimos:

Verpstiškosios poduros (Entomobryidae)

Izotomos (Isotomidae)

Grybinės poduros (Hypogastruridae)

Aklosios poduros (Onychiuridae). Pav.

Poduros (Poduridae)

Rutuliškosios poduros (Sminthuridae)



Skenuok ir peržiūrėk  
naujausią informaciją

**seskinesozas.lt**

Biologinės įvairovės projektas

Duomenys: iNaturalist, Wikipedia, GBIF

iNaturalist rūšies puslapis