



Uoginė skydblakė

Dolycoris baccarum

Rangas: **species**

1

STEBĖJIMŲ

1

STEBĖTOJŲ

Gegužė

PIKO MĒNUO

KARALYSTĖ

Animalia

KLASĖ

Insecta

ŠEIMA

Pentatomidae

GENTIS

Dolycoris

Kur ir kada stebėti?

Daugiausia stebėjimų užfiksuota gegužę. Geriausias stebėjimo metas — vidurdienis šiltą saulėtą dieną.

Apie rūšį

Uoginė skydblakė (*Dolycoris baccarum*) – skydblakių (*Pentatomidae*) šeimos blakių rūšis.

Kūno ilgis 9,5 – 13 mm. Antenos juodos su baltais, gelsvais skersiniais dryžiais. Antsparniai rudai, geltonai, raudonai rudi, trikampis skydelis dažniausiai žaliai geltonas su šviesia viršūnėle. Pilvelio kraštai (*connexivum*) juodai baltai dryžuoti. Kūno pačia gelsva, balsva. Visas kūnas apaugęs ilgais plaukeliais ir padengtas juodais taškučiais. Prieš žiemojimą visas kūnas patamsėja, pasidaro pilkai rudas. Patinai ir patelės yra labai panašūs.

Lervos taip pat apaugusios tankiais šviesiais plaukeliais, galva ir krūtinė (pirmose dviejose stadijose) juoda, vėliau pašviesėja, pasidaro gelsvai ruda su tamsiomis dėmėmis. Pilvelis geltonas su paraudusiais segmentų pakraščiais. Lervos gausiai randamos ant dygiųjų slyvų (*Prunus spinosa*) ir kitų vaismedžių. Lervos randamos liepos – rugsėjo mėnesiais (ankstyviausia rasta gegužės 5d.).

Tiek suaugėliai, tiek lervos yra polifagai – gali maitintis įvairiais augalais: sausmedinių (*Caprifoliaceae*) šeimos augalais, uogomis, varpiniais augalais, daržo augalais. Tolimuosiuose Rytuose laikomas sojos, rugių, javų ir dobilų kenkėju. Šios blakės praduria gležnus lapelius, vaisius, augalų kotelius ir siurbia sultis.

Gyvena pievose, miško proskynose, krūmynuose, daržuose, kai kada medžiuose.

Paplitimas: Transpalearktika, Europa, Azija. Viena dažniausiai sutinkamų skydblakių Lietuvoje.

Natūralūs entomofagai (priešai): tachinos (*Cylindromyia auriceps*) parazituoja kiaušinėlius.



Skenuok ir peržiūrėk
naujausią informaciją

seskinesozas.lt

Biologinės įvairovės projektas
Duomenys: iNaturalist, Wikipedia, GBIF
iNaturalist rūšies puslapis