



# Paprastasis auksavabalis

*Cetonia aurata*

Rangas: **species**

2

STEBĖJIMŲ

2

STEBĖTOJŲ

**Birželis**

PIKO MĖNUO

KARALYSTĖ

**Animalia**

KLASĖ

**Insecta**

ŠEIMA

**Scarabaeidae**

GENTIS

*Cetonia*

## Kur ir kada stebėti?

Daugiausia stebėjimų užfiksuota birželį. Geriausias stebėjimo metas — vidurdienis šiltą saulėtą dieną.

## Apie rūšį

Paprastasis auksavabalis ar bronzinukas (*Cetonia aurata*) – auksavabalių (*Cetoniidae*) šeimos vabalas.

Kūnas 14 - 20 mm. Kresnas, metalo blizgesio. Viršutinė pusė žalios, žaliai auksiškos, žaliai bronzinės, ar žaliai violetinės spalvos; apatinė pusė vario raudonumo. Antsparniai su balsvomis skersinėmis dėmelėmis. Šoniniai antsparnių kraštai su išilgine išpjova, per kurią vabalas gali išskleisti sparnus nepakėlęs antsparnių, kurie yra suaugę.

Vabalai skraido birželio – liepos mėn. saulėtomis dienomis. Aptinkami ant žolinių, ypač skėtinių augalų ir įvairių krūmų žiedų. Taip pat prie ištekančių ir rūgstančių beržo bei ąžuolo sulčių.

Lervos vystosi trūnijančioje įvairių lapuočių medienoje, puveningoje dirvoje, galvijų mėšle, komposte. Gyvų augalų šaknų neliečia.

Lietuvoje labai dažna rūšis.



Skenuok ir peržiūrėk  
naujausią informaciją

**seskinesozas.lt**

Biologinės įvairovės projektas

Duomenys: iNaturalist, Wikipedia, GBIF

iNaturalist rūšies puslapis