



Kopūstinis Baltukas

Pieris brassicae

Rangas: **species**

1

STEBĖJIMŲ

1

STEBĖTOJŲ

Rugpjūtis

PIKO MĖNUO

KARALYSTĖ

Animalia

KLASĖ

Insecta

ŠEIMA

Pieridae

GENTIS

Pieris

Kur ir kada stebėti?

Daugiausia stebėjimų užfiksuota rugpjūtį. Geriausias stebėjimo metas — vidurdienis šiltą saulėtą dieną.

Apie rūšį

Kopūstinis baltukas, kopūstinukas, kopūstinis drugys (lot. *Pieris brassicae*) – baltukų (*Pieridae*) šeimos drugių rūšis. Tai vienas iš įprasčiausių ir visoje šalies teritorijoje paplitusių drugių. Dydis 50-65 mm. Priekinių sparnų viršūnė juoda (ropinio baltuko ir griežtinio baltuko – pilka), patelės dar turi 2 juodas dėmes arčiau išorinio krašto. Užpakalinių sparnų priekinė dalis su juoda dėme.

Per metus išsivysto dvi generacijos. Pirmosios generacijos drugiai skraido V–VI pr., antros – VII–VIII mėn. Vikšrai su trumpais šereliais, žali, su geltonomis juostelėmis nugarinėje pusėje ir geltonais taškais šonuose. Minta įvairiais bastutiniais augalais, taip pat ir kai kuriomis šio šeimos daržovėmis (pvz., kopūstais). Lėliukė gelsva ar žalsva, šonuose su 3 geltonomis juostelėmis.



Skenuok ir peržiūrėk
naujausią informaciją

seskinesozas.lt

Biologinės įvairovės projektas
Duomenys: iNaturalist, Wikipedia, GBIF
iNaturalist rūšies puslapis