



Rūgštytinis strėlinukas

Acronicta rumicis

Rangas: **species**

1

STEBĖJIMŲ

1

STEBĖTOJŲ

Liepa

PIKO MĖNUO

KARALYSTĖ

Animalia

KLASĖ

Insecta

ŠEIMA

Noctuidae

GENTIS

Acronicta

Kur ir kada stebėti?

Daugiausia stebėjimų užfiksuota liepą. Geriausias stebėjimo metas — vidurdienis šiltą saulėtą dieną.

Apie rūšį

Rūgštytinis strėlinukas (*Acronicta rumicis*) – pelėdgalvių (*Noctuidae*) šeimos drugys. Lietuvoje dažna rūšis. Priekiniai sparnai rusvai pilki, su šviesesniais šešėliais. Prie išorinio pakraščio yra eilė neaiškių balsvų linijų, prie vidinio pakraščio – pusmėnulio formos balta dėmė. Užpakaliniai sparnai pilki, tamsiu išoriniu pakraščiu. Skraido dvi generacijos: gegužės – birželio ir liepos – rugpjūčio mėn.

Vikšras iki 40 mm ilgio, rudai juodas, su raudonomis dėmėmis ant baltos šoninės juostos, plaukuotas. Plaukeliai ilgi ir ant karpelių susitelkę į kuokštelius. Gyvena ant įvairių žolinių augalų, ypač ant rūgštynių ir rūgčių. Žiemoja lėliukės.



Skenuok ir peržiūrėk
naujausią informaciją

seskinesozas.lt

Biologinės įvairovės projektas

Duomenys: iNaturalist, Wikipedia, GBIF

iNaturalist rūšies puslapis