



# Kvapioji našlaitė

*Viola odorata*

Rangas: **species**

2

STEBĖJIMŲ

2

STEBĖTOJŲ

**Balandis**

PIKO MĖNUO

KARALYSTĖ

**Plantae**

KLASĖ

**Magnoliopsida**

ŠEIMA

**Violaceae**

GENTIS

**Viola**

## Kur ir kada stebėti?

Daugiausia stebėjimų užfiksuota balandį.

## Apie rūšį

Kvapioji našlaitė (*Viola odorata*) – našlaičių (*Viola*) genties gėlė, natūraliai paplitusi Europoje ir Azijoje bei introdukuota Šiaurės Amerikoje.

Tai nedideli (5-10 cm), labai kvapnūs augalai. Lapai apvalūs. Žiedai įvairiaspalviai, dažniausiai violetiniai, mėlyni, rausvi. Žydi balandžio-gegužės mėnesiais. Auga miško proskynose, tačiau neretai auginamos darželiuose, sudaro sąžalynus. Kvapnioji našlaitė geriausiai auga drėgname, gerai patarštame, daug maistingųjų medžiagų turinčiame dirvožemyje, daliniame pavėsyje. Augalas labiausiai tinka laukinių ar sumedėjusių augalų sodui.

Atspari šalčiui kvapnioji našlaitė gausiai pasisėja pati arba plinta palaipomis, sudarydama kilimą. Norint tai pagreitinti, pavasarį ar rudenį kerus reikia dalinti. Norint pailginti žydėjimo laiką, reikia pašalinti nuvytusius žiedus. Kvapiąją našlaitę dažnai pažeidžia mozaikos virusai, rūdis, ir miltligę sukeltantys grybai.

Visas augalo dalis, ypač žiedus ir šaknis, pavasarį galima vartoti gydymui.



Skenuok ir peržiūrėk  
naujausią informaciją

**seskinesozas.lt**

Biologinės įvairovės projektas  
Duomenys: iNaturalist, Wikipedia, GBIF

iNaturalist rūšies puslapis