



# Vaistinė česnakūnė

*Alliaria petiolata*

Rangas: **species**

8

STEBĖJIMŲ

5

STEBĖTOJŲ

Gegužė

PIKO MĖNUO

KARALYSTĖ

**Plantae**

KLASĖ

**Magnoliopsida**

ŠEIMA

**Brassicaceae**

GENTIS

*Alliaria*

## Kur ir kada stebėti?

Dažniausiai aptinkama šeškinės ozo šiaurinė dalis. Daugiausia stebėjimų užfiksuota gegužę.

## Apie rūšį

Vaistinė česnakūnė – (lot. *Alliaria petiolata*, angl. Garlic Mustard, vok. Knoblauchsrauke) – bastutinių (*Brassicaceae*) šeimos česnakūnių (*Alliaria*) genties augalas.

Dvimetis arba daugiametis, 20-100 cm aukščio žolinis augalas, kvėpiantis česnaku, ypač patrintas. Stiebas stačias, briaunotas, apatinė dalis apaugusi baltais, ilgais, žemyn palinkusiais plaukeliais, lapuotas. Lapai ploni, pliki, pamatiniai ilgakočiai, inkstiški, karbuoti, stiebiniai gerokai trumpesniais lapkočiais, nelygiai dantyti, trikampiai. Žiedkočiai gana ilgi, laibi. Žiedai stiebo viršūnėje. Taurėlapiai 4, statūs, 2-3 mm ilgio. Vainiklapiai 4, balti, dvigubai ilgesni už taurėlapius, su trumpais nageliais. Vaisius – cilindriška, briaunota, 3-6 cm ilgio ir 2 mm pločio, atsilošusi ankštara. Sąvaros išgaubtos, su gana ryškia vidurine gysla. Pertvara plona, permatoma. Sėklos nedidelės, pailgos, juosvai rusvos, išsidėsčiusios lizde viena eile.

Žydi nuo balandžio iki birželio mėn. Dažna visoje Lietuvoje. Auga lapuočių miškuose, miškų pakelėse ir aikštelėse, krūmuose, upių ir paežerių šlaituose, patvoriuose, šiukšlynuose, žvyrnuose. Lietuvoje beveik nevartojamas, bet Kaukazo gyventojų gana mėgstamas prieskoninis augalas. Vaistinis. Medingas.

Vaistinei žaliai ruošiami lapai augalams žydinti, taip pat visiškai prinokusios sėklos. Lapuose ir sėklose yra eterinio aliejaus, askorbino rūgšties, mineralinių ir kitų medžiagų, sėklose – džiuostančio aliejaus.



Skenuok ir peržiūrėk  
naujausią informaciją

**seskinesozas.lt**

Biologinės įvairovės projektas  
Duomenys: iNaturalist, Wikipedia, GBIF  
iNaturalist rūšies puslapis