



Karpytūnė

Polygonia c-album

Rangas: **species**

3

STEBĖJIMŲ

3

STEBĖTOJŲ

Birželis

PIKO MĒNUO

KARALYSTĖ

Animalia

KLASĖ

Insecta

ŠEIMA

Nymphalidae

GENTIS

Polygonia

Kur ir kada stebėti?

Daugiausia stebėjimų užfiksuota birželį. Geriausias stebėjimo metas — vidurdienis šiltą saulėtą dieną.

Apie rūšį

Karpytūnė – pleštekių (Nymphalidae) šeimos drugys. Paplitęs Europoje, Azijoje, Šiaurės Afrikoje. Lietuvoje dažna rūšis.

Išvaizda ir elgsena

Dydis 45-55 mm. Sparnai raudoni su gausiomis įvairaus dydžio juodomis dėmėmis. Priekinių sparnų užpakalinis kraštas su lanko pavidalo iškarpa, išorinis kraštas dantytas. Užpakalinių sparnų apačia tamsiai rusva su balta C raidės formos dėme.

Kiaušinėlius deda po vieną ant mitybinių augalų: apynių, serbentų, dilgėlių, lazdynų. Vikšrai oranžiškai rudi, apaugę baltais šereliais. Pilvelio šonuose oranžinės išilginės juostos. Lėliukė ruda, su labai išlenkta krūtine, ant kurios daug dėmių. Žiemoja antros generacijos drugiai.

Buveinės

Drugiai skraido nuo kovo vidurio iki spalio pradžios lapuočių ir mišrių miškų pakraščiuose, parkuose, paupiuose, senuose soduose ir kt.



Skenuok ir peržiūrėk naujausią informaciją

seskinesozas.lt

Biologinės įvairovės projektas

Duomenys: iNaturalist, Wikipedia, GBIF

iNaturalist rūšies puslapis