



Šiurkščioji žvynoklė

Chlorophyllum rhacodes

Rangas: **species**

1

STEBĖJIMŲ

1

STEBĖTOJŲ

Liepa

PIKO MĒNUO

KARALYSTĖ

Fungi

KLASĖ

Agaricomycetes

ŠEIMA

Agaricaceae

GENTIS

Chlorophyllum

Kur ir kada stebėti?

Daugiausia stebėjimų užfiksuota liepą.

Apie rūšį

Šiurkščioji žvynabudė (lot. *Macrolepiota rhacodes*, sin. *Chlorophyllum rhacodes*) – pievagrybinių (Agaricaceae) šeimos, žvynabudėžų (*Macrolepiota*) genties grybų rūšis.

Augimo vieta

Spygliuočių miškai, ypač drėgni žolėti eglynai.

Augimo laikas

Vasara (retai), ruduo.

Pagrindiniai požymiai

Perpjovus ar perlaužus kepurėlės ir koto trama paraudonuoja.

Labai panaši į skėtinę žvynabudę, skiriasi mažesniais vaisiakūniais. Kepurėlė 10–12 cm skersmens, jauna ovališka, senesnių grybų gaubta, net plokščia, apaugusi dideliais pilkais rudais žvynais. Lakšteliai balti, senesnių – rusvi, platūs. Kotas 8–12 (15) cm ilgio, 3–4 cm storio, su rinkiu, lygus, nežvynuotas, iš pradžių baltas, vėliau šviesiai rudas, prie pagrindo sustorėjęs, bet be išnaros. Trama balta, minkšta, perlaužus, įgauna rusvą, rausvą, oranžinį atspalvį, malonaus kvapo. Sporos 8–12×6–7,5 μm, taip pat mažesnės nei skėtinės.

Būdingi požymiai: mažesnė už skėtinę žvynabudę, raudonuoju trama.

Valgoma, bet ne tokia skani kaip skėtinė žvynabudė, tačiau baimintis nereikėtų, nes pagal paraudonavimą ir augavietę lengvai atpažįstama, o dėl skonio ne per blogiausias grybas. Nereta.



Skenuok ir peržiūrėk
naujausią informaciją

seskinesozas.lt

Biologinės įvairovės projektas

Duomenys: iNaturalist, Wikipedia, GBIF

iNaturalist rūšies puslapis