



Paprastoji rietmenė

Echinochloa crus-galli

Apsaugos statusas: Mažai rūpimos (LC)

Rangas: **species**

1

STEBĖJIMŲ

1

STEBĖTOJŲ

Rugsėjis

PIKO MĖNUO

KARALYSTĖ

Plantae

KLASĖ

Liliopsida

ŠEIMA

Poaceae

GENTIS

Echinochloa

Kur ir kada stebėti?

Daugiausia stebėjimų užfiksuota rugsėjį.

Apie rūšį

Paprastoji rietmenė – miglinių (Poaceae) šeimos rietmenių (*Echinochloa*) genties augalas. Natūraliai paplitęs po visą pasaulį, dažnas visoje Lietuvoje.

Ekologija

Auga daržuose, laukuose, pakelėse, dykvietėse. Mėgsta drėgnesnį, azotu turtingą dirvožemį. Jautrus šalčiams, todėl po pirmųjų rudens šalnų numiršta.

Gana įkyri daržų ir laukų piktžolė, kai kuriose valstybėse paskelbta invazine rūšimi.

Žiedus apdulkina vėjas. Paukščiai lesa sėklas.

Biologija

Tai vienmetis, 30-100 cm aukščio žolinis augalas. Stiebas status, lygus, bambliuotas, šakotas, viršutinė dalis žalia, apatinė violetinė, bambliai plaukuoti. Lapai 5-65 cm ilgio, 0,6-2,2 cm pločio, linijiški, šiurkščiu pakraščiu.

Gana storos varpos stiebo viršūnėje sudaro 2-10 cm ilgio kekes, jų būna nuo 5 iki 40. Kekės sudaro 5-21 cm ilgio šluotelę. Varpos iš smulkių varpučių, jos susitelkusios po 3-6. Žiedai žalsvi, neišvaizdūs – žvyneliais apgaubti 3 kuokeliai ir piestelė. Žydi liepos-rugsėjo mėnesiais. Vaisius – grūdas. Vaisiai subręsta rugsėjo-spalio mėnesiais. Sėklos kiaušiniškos, 1,5-2 mm ilgio. Augalas subrandina sėklas tik šiltais metais.

Naudojimas

Paprastoji rietmenė yra neblogas galvijų pašarinis augalas, taip pat tinkantis ir silosui, bet ne šienai. Jauni ūgliai yra vartojami kaip daržovė. Naudojama indų liaudies medicinoje nuo piktvotės, kraujavimo, sužeidimų, problemų su blužnimi.



Skenuok ir peržiūrėk
naujausią informaciją

seskinesozas.lt

Biologinės įvairovės projektas

Duomenys: iNaturalist, Wikipedia, GBIF

iNaturalist rūšies puslapis