



Miškinis Storgalvis

Ochlodes sylvanus

Apsaugos statusas: Mažai rūpimos (LC)

Rangas: **species**

3

STEBĖJIMŲ

1

STEBĖTOJŲ

Gegužė

PIKO MĖNUO

KARALYSTĖ

Animalia

KLASĖ

Insecta

ŠEIMA

Hesperiidae

GENTIS

Ochlodes

Kur ir kada stebėti?

Dažniausiai aptinkama šeškinės ozo pietinė dalis. Daugiausia stebėjimų užfiksuota gegužę. Geriausias stebėjimo metas — vidurdienis šiltą saulėtą dieną.

Apie rūšį

Miškinis storgalvis (*Ochlodes sylvanus*) – hesperijų (Hesperiidae) šeimos drugys.

Lytinis dimorfizmas ryškus. Patino priekinis sparnas su juoda androkoninių žvynų juosta. Panašus į gelsvažalį storgalvį (*Hesperia comma*), bet sparnų apačia be baltų dėmių.

Sparno ilgis: 12-15 mm.

Skraido birželio - liepos mėnesiais pamiškių pievose, paupiuose, paežerėse, parkuose, žmonių gyvenamojoje aplinkoje. Dažnai matomas tupintis ant aviečių lapų.

Mitybiniai augalai: miglė (*Poa* sp.), valkūnas (*Agropyron* sp.), eraičinas (*Festuca* sp.) ir kiti migliniai.

Kiaušinėlius po vieną deda ant mitybinių augalų. Žiemoja vikšrai.

Paplitimas: Palearktika.



Skenuok ir peržiūrėk
naujausią informaciją

seskinesozas.lt

Biologinės įvairovės projektas

Duomenys: iNaturalist, Wikipedia, GBIF

iNaturalist rūšies puslapis