



## Pilkoji tauriabudė

*Clitocybe nebularis*

Rangas: **species**

1

STEBĖJIMŲ

1

STEBĖTOJŲ

palis

PIKO MĒNUO

KARALYSTĖ

Fungi

KLASĖ

Agaricomycetes

ŠEIMA

Tricholomataceae

GENTIS

*Clitocybe*

### Kur ir kada stebėti?

Daugiausia stebėjimų užfiksuota spalį.

### Apie rūšį

Pilkoji tauriabudė (lot. *Clitocybe nebularis*) – baltikinių (*Tricholomataceae*) šeimos, tauriabudžių (*Clitocybe*) genties grybų rūšis.

Augimo vieta

Spygliuočių, mišrieji miškai, krūmokšniai, tarp žolių.

Augimo laikas

Vasara (retai), rudenį (dažniau antroje pusėje).

Pagrindiniai požymiai

Vaisiakūniai pelenų spalvos, stamboki, aštraus puvėsių, miltų kvapo.

Vaisiakūniai dideli arba dideli, tamprūs, mėsingi. Kepurėlė 7–12 (20) cm skersmens, iš pradžių apvali, iškili, vėliau paplokščia ar net įdubusi, su buku gūbreliu, matinė, plaušuota, mėsinga, pelenų spalvos. Lakšteliai balsvi, vėliau – gelsvos spalvos, tankūs, siauri, priaugtiniai arba pusiau nauaugtiniai. Kotas 7–12×1–3 cm, tamprus, plaušuotas, kartais į pagrindą storėjantis, balsvas, pilkšvas, rusvas, tvirtai suaugęs su substratu. Trama balta, pilkšva, aštraus, nemalonaus medienos, miltų kvapo, mekarti. Sporos 6–8×3–4,5 μm.

Būdingi požymiai: senos kepurėlės apsinešusios, baltai mūsuotos, lyg miltuotos.

Auga grupelėmis. Valgomas, vokiečių mikologų giriama. Dažna. Naudingas miškui – aktyviai ardo paklotę.

Labai panaši į Aleksandro tauriabudę, bet skiriasi pelenų spalvos vaisiakūniais, nemalonaus kvapo trama, ilgesniu, kietesniu kotu.



Skenuok ir peržiūrėk  
naujausią informaciją

**seskinesozas.lt**

Biologinės įvairovės projektas

Duomenys: iNaturalist, Wikipedia, GBIF

iNaturalist rūšies puslapis