



## Ažuolinis skiautenėlis

*Panellus stipticus*

Rangas: **species**

1

STEBĖJIMŲ

1

STEBĖTOJŲ

**Kovas**

PIKO MĒNUO

KARALYSTĖ

Fungi

KLASĖ

Agaricomycetes

ŠEIMA

Mycenaceae

GENTIS

*Panellus*

### Kur ir kada stebėti?

Daugiausia stebėjimų užfiksuota kovą.

### Apie rūšį

Ažuolinis skiautenėlis (lot. *Panellus stipticus*) – šalmabudinių (Mycenaceae) šeimos, skiautenėlių (*Panellus*) genties grybų rūšis.

Augimo vieta

Ant negyvos lapuočių medienos, ypač ąžuolo kelmų, stuobrių, išvartų.

Augimo laikas

Ruduo, nešalta žiema, pavasaris, vasara.

Pagrindiniai požymiai

Lapuočių medienos saprotrofas, sporos amiloidinės.

Vaisiakūniai smulkūs. Kepurėlė 1–3 (4) cm skersmens, inksto, vėduoklės, kriauklės formos, ekscentrinė, plaušuota, žvynuota, ties šoniniu koteliu įdubusi, ochriškai geltonai rudos, rusvai gelsvos spalvos, išblunkanti iki pilkšvos. Lakšteliai ploni, tankūs, rusvai geltoni, rusvi, priaugtiniai. Kotas 1–2×0,3–0,5 cm, pamatinėje dalyje nusmailėjęs, plaušutas, ekscentrinis, lakštelių spalvos. Trama odiška, tampri, ochriškai gelsva, malonaus kvapo, aštraus, kartoko skonio. Sporos 3–6×2–3 μm.

Būdingi požymiai: vaisiakūniai odos geltonumo, kotas ekscentrinis, auga daugiausia tik ant negyvos ąžuolo medienos. Dygsta grupelėmis. Labai dažnas. Medienos saprotrofas. Nevalgomas ar net nuodingas.



Skenuok ir peržiūrėk  
naujausią informaciją

**seskinesozas.lt**

Biologinės įvairovės projektas

Duomenys: iNaturalist, Wikipedia, GBIF

iNaturalist rūšies puslapis