



Kvapusis auksavabalis

Oxythyrea funesta

Rangas: **species**

2

STEBĖJIMŲ

2

STEBĖTOJŲ

Birželis

PIKO MĒNUO

KARALYSTĖ

Animalia

KLASĖ

Insecta

ŠEIMA

Scarabaeidae

GENTIS

Oxythyrea

Kur ir kada stebėti?

Daugiausia stebėjimų užfiksuota birželį. Geriausias stebėjimo metas — vidurdienis šiltą saulėtą dieną.

Apie rūšį

Kvapusis auksavabalis (*Oxythyrea funesta*) – auksavabalių (Cetoniidae) šeimos vabalas. Kūnas 8 - 12 mm. Juodas arba juodai žalsvas, kartais bronzinio atspalvio. Priešnugarėlė netaisyklingai taškuota, su šešiom baltom dėmelėmis, i šsidėsčiusiomis dviem išilginėmis eilėmis. Antsparniai su 5 baltų taškų eilėmis.

Aptinkama ant įvairių augalų žiedų birželio mėnesį.

Lervos vystosi dirvoje, minta augaliniu detritu.



Skenuok ir peržiūrėk
naujausią informaciją

seskinesozas.lt

Biologinės įvairovės projektas

Duomenys: iNaturalist, Wikipedia, GBIF

iNaturalist rūšies puslapis