



## Paprastasis marguolis

*Zygaena lonicerae*

Rangas: **species**

1

STEBĖJIMŲ

1

STEBĖTOJŲ

**Birželis**

PIKO MĖNUO

KARALYSTĖ

**Animalia**

KLASĖ

**Insecta**

ŠEIMA

**Zygaenidae**

GENTIS

*Zygaena*

### Kur ir kada stebėti?

Daugiausia stebėjimų užfiksuota birželį. Geriausias stebėjimo metas — vidurdienis šiltą saulėtą dieną.

### Apie rūšį

Paprastasis marguolis – marguolių (Zygaenidae) šeimos drugys.

Sparno ilgis – 15,5-19 mm.

Tai dažniausiai Lietuvoje sutinkamas marguolis. Juos galima surasti įvairiuose biotopuose: pajūrio miškuose, pušynuose, tiek spygliuočių, tiek lapuočių miškuose, tiek mišriuose miškuose bei pamiškėse, sausapievėse, vidurinio drėgnumo pievose, stepinėse pievose, paupiuose, paežerėse. Šių drugių dažniausiai randama po keletą. Paprastieji marguoliai skraido saulėtomis dienomis, o ūkanotomis dažniausiai tupi ant buožainės (Knautia) žiedynų. Šie marguoliai sutinkami birželio – liepos mėnesiais.

Vikšrai išmarginti juodų taškų linijomis. Jų randama ant įvairių laukinių dobilų, raženių, esparcetų ir kitų augalų. Kokonas būna prisitvirtinęs išilgai smilgos ar kito žolinio augalo.



Skenuok ir peržiūrėk  
naujausią informaciją

**seskinesozas.lt**

Biologinės įvairovės projektas

Duomenys: iNaturalist, Wikipedia, GBIF

iNaturalist rūšies puslapis