



Krūminė šunmėtė

Clinopodium vulgare

Rangas: **species**

3

STEBĖJIMŲ

3

STEBĖTOJŲ

Birželis

PIKO MĒNUO

KARALYSTĖ

Plantae

KLASĖ

Magnoliopsida

ŠEIMA

Lamiaceae

GENTIS

Clinopodium

Kur ir kada stebėti?

Dažniausiai aptinkama šeškinės ozo šiaurinė dalis. Daugiausia stebėjimų užfiksuota birželį.

Apie rūšį

Krūminė šunmėtė (*Clinopodium vulgare*) – notrelinių (*Lamiaceae*) šeimos, šunmėčių (*Clinopodium*) genties augalų rūšis.

Daugiametis žolinis augalas. Stiebas 30-60 cm aukščio, status, kartais kylantis, dažniausiai nešakotas, plaukuotas. Lapai 2-5 cm ilgio, 1-2 cm pločio, smulkiai karbuotai dantyti, plaukuoti. Žiedai susitelkę į gausiažiedžius menturius viršutinių lapų pažastyse ir stiebo viršūnėje. Vainikėlis purpurinis, kartais balsvas. Vaisius – 0,9-1,1 mm ilgio, rudas arba gelsvas riešutėlis.

Žydi liepos–rugsėjo mėn. Vaisiai subręsta rugpjūčio–rugsėjo mėn. Dauginasi sėklomis ir šakniastiebiais.

Auga šviesiuose miškuose, pamiškėse, krūmuose, kalkinguose šlaituose.

Žaliavoje yra eterinio aliejaus, saponinų, glikozidų, askurbino, betulino, kumaro, vanilino ir kitokių organinių rūgščių, d azinių ir mineralinių medžiagų.

Vartojama kaip arbatos pakaitalas ir kaip prieskonis.

Augalas medingas, dažinis.



Skenuok ir peržiūrėk
naujausią informaciją

seskinesozas.lt

Biologinės įvairovės projektas

Duomenys: iNaturalist, Wikipedia, GBIF

iNaturalist rūšies puslapis